


# Logica booleana

## Informatica@DSS 2020/2021

Massimo Lauria <massimo.lauria@uniroma1.it>  
<https://massimolauria.net/informatica2020/>

# George Boole (1815–1864)



Fondatore della logica matematica

- ▶ studio formale dei ragionamenti usati in matematica
- ▶ uso di manipolazioni algebriche per concetti logici

# Operatori logici

Operatori che combinano espressioni booleane.

	Matematica	Python
negazione	$\neg x$	<code>not x</code>
congiunzione	$x \wedge y$	<code>x and y</code>
disgiunzione	$x \vee y$	<code>x or y</code>

# Negazione logica $\neg x$

Assume il valore opposto della variable  $x$

$x$	$\text{not } x$
False	True
True	False

```
porta_chiusa = False  
porta_aperta = not porta_chiusa  
print(porta_aperta)
```

1

2

3

True

**Domanda:** a cosa è uguale  $\text{not not } x$ ?

# Congiunzione logica $x \wedge y$

La congiunzione è vera quando  $x$  e  $y$  sono entrambi veri.

x	y	x and y
False	False	False
True	False	False
False	True	False
True	True	True

**Esercizio:** Quando vale `True` l'espressione seguente?

`a1 and a2 and a3 and a4 and a5`

1

# Esempio di congiunzione logica

```
vento = True      1  
neve  = True      2  
tormenta = vento and neve  3  
print(tormenta)   4
```

True

# Disgiunzione logica $x \vee y$

La disgiunzione è vera quando **almeno uno** tra  $x$  e  $y$  è vero.

x	y	x or y
False	False	False
True	False	True
False	True	True
True	True	True

**Esercizio:** Quando vale True l'espressione seguente?

```
a1 or a2 or a3 or a4 or a5
```

1

# Esempio di disgiunzione logica

```
nuvoloso = True           1
pioggia   = False         2
brutto_tempo = pioggia or nuvoloso  3
print(brutto_tempo)      4
```

True



# Associatività e Commutatività

Un operatore tra due operandi, chiamiamolo  $\circ$ , si dice

- ▶ associativo, quando  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- ▶ commutativo, quando  $a \circ b = b \circ a$

**Esercizio:** dimostrare che se un operatore  $\circ$  è associativo e commutativo, allora comunque vengano messe le parentesi o ordinati gli operandi nella seguente espressione

$$a_1 \circ a_2 \circ a_3 \cdots a_{n-1} \circ a_n$$

il valore dell'espressione non cambia.

# Differenze con il linguaggio naturale

Nel linguaggio naturale si usa `or` in modo diverso

vado al mare o in montagna

intendendo alternative **esclusive**.

Invece l'`or` logico funziona in maniera differente, ne senso che il risultato è vero anche se entrambe le opzioni sono vere.

## Or esclusivo $x \oplus y$

L'or esclusivo (XOR) è vero quando **esattamente uno** tra  $x$  e  $y$  è vero. Lo XOR è denotato anche come  $x \oplus y$ .

$x$	$y$	$x \oplus y$
False	False	False
True	False	True
False	True	True
True	True	False

**Esercizio:** Quando vale `True` l'espressione seguente?

```
a1 ^ a2 ^ a3 ^ a4 ^ a5
```

1

# Regole di de Morgan

$\neg(x \vee y)$  è uguale a  $\neg x \wedge \neg y$

ed anche

$\neg(x \wedge y)$  è uguale a  $\neg x \vee \neg y$

**Esercizio:** verificare tutti e 4 i casi

# Distributività

$x \wedge (y \vee z)$  è uguale a  $(x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

ed anche

$x \vee (y \wedge z)$  è uguale a  $(x \vee y) \wedge (x \vee z)$

**Esercizio:** verificare tutti gli 8 casi